

EL CUIDADO DE SU MASCOTA DESPUES DE LA CIRUGIA

Apetito / Alimentación

- La anestesia puede afectar en gran medida el apetito de un animal y el confort digestivo. Se recomienda limitar el consumo de agua durante la primera hora después de llegar a casa y alimentar a la mitad de una comida normal esta noche. Si no se produce vómito y el animal sigue apareciendo tener hambre, es posible alimentar a la otra ½. Si el animal no muestra interés en comer o vomita la comida, es recomendable dejar que él / ella se relaje y vuelva a intentarlo por la mañana. Si la falta de apetito dura más de 2 días, por favor notifíquenos inmediatamente.
- Si su mascota se niega a beber agua durante más de un día, vomita durante más de 24 horas, o tiene diarrea por más de 24 horas sin la mejora, por favor háganoslo saber lo antes posible.
- Muchos pacientes pueden no tener una evacuación intestinal durante 24-36 horas después de la cirugía, esto es normal.
- Su mascota recibió gas anestésico y oxígeno por un tubo que va directamente a la tráquea. Tos o irritación puede ocurrir durante 1-2 días después de la cirugía.

Actividad

- Su mascota debe tener ejercicio o actividad limitada. Esto incluye la restricción de saltar en la cama o en el sofá, subir y bajar escaleras, etc. Usted puede permitir que su mascota regrese a niveles de actividad normales en 10-14 días.
- Le recomendamos ofrecer a su mascota un lugar tranquilo y cómodo para descansar que ofrece protección de otros animales y niños. Muchas mascotas les gusta estar solos después de la cirugía. Esto también anima a descansar en su lugar de juego. Por favor, recuerde revisar en él / ella con frecuencia.

Sitio de incisión / Medicamentos

- Es muy importante prevenir a su mascota que lama o mastique el lugar de la incisión. Para limitar este riesgo, hemos enviado un cono casa. Estos conos deben permanecer en su mascota en todo momento por lo menos 10 días después de la cirugía. Si su mascota empieza a lamer o masticar en la incisión y usted no recibió un cono, puede recoger uno de nosotros o usted puede comprar uno en PetSmart, Wal-Mart, PetCo, etc.

- Por favor de revisar la incisión diariamente por signos de hinchazón, enrojecimiento o supuración.

Si usted nota cualquiera de estos síntomas o la sutura aparece irritada, por favor háganoslo saber inmediatamente.

- La incisión debe mantenerse seca durante al menos 10 días. No se aconseja nadar o bañarse. Si usted siente la necesidad de limpiar alrededor de la incisión, puede hacerlo usando un trapo húmedo y tibio y toque suave alrededor del sitio.
- Los fármacos anestésicos se inyectan en un catéter intravenoso en la vena de una pierna directamente antes de la cirugía. Usted puede notar que esta zona ha sido afeitada y también puede haber moretones leves y picazón en el lugar de la inyección. Lamer o masticar en este sitio por su mascota debe ser evitado.
- No hay suturas que se tengan que remover. La sutura está debajo de la piel y debe ser absorbida por el cuerpo. Nosotros ponemos pegamento de la piel en la incisión para ayudar a mantener la capa externa de la piel cerrada. Esto puede aparecer como una sustancia crujiente - como azul en el exterior de la incisión y es normal.
- Todas las mascotas se les da una inyección de medicamento para el dolor. Para los perros, por favor administrar una dosis de analgésicos orales a partir de la mañana después de la cirugía. Por favor, lea cuidadosamente la etiqueta de instrucciones de dosificación.

• No le dé medicamentos para el dolor humano a su mascota! Estos medicamentos pueden ser mortales!

Nota: Como no somos un hospital veterinario de servicio completo, puede que tenga que ponerse en contacto con su veterinario de servicio completo regular para asistencia o una de las 2 clínicas de emergencia al 702-457-8050 o 702-822-1045. Esto sería necesario para cualquier hora después de las emergencias.

Firma

Imprima su Nombre

Fecha

Nuestro teléfono: 702-384-3333 Ext 113 cirugias publicas o 120 Clinica.